



RX beeld van tijdens de behandeling

Resultaten

Het resultaat van een inspuiting is meestal goed (tot 90% van de patiënten ervaart minder pijn). Het doel van de injecties is om de pijn te laten verdwijnen die de normale mobiliteit beperkt. Op deze manier kunnen verdere training en oefeningen van de rug pijnvrij worden aangevat.

Na de behandeling

Na de behandeling mag u niet zelf auto rijden. Regel daarom iemand die u brengt en ophaalt.

Totdat de cortisone begint te werken kan u nog steeds pijn voelen. U kunt hier een pijnstiller voor gebruiken maar enkel maar van het type paracetamol (Dafalgan®). U kan ook warmte of ijs appliceren op de onderrug.

Achteraf?

Na ongeveer twee weken krijgt u best een controle bij de arts die het onderzoek heeft voorgeschreven. Tijdens de controle wordt gekeken of de pijn is verbeterd. De arts beslist dan ook of u extra moet worden behandeld met aanvullende therapieën zoals rugschool, fysiotherapie, ... Soms is het nodig de behandeling te herhalen afhankelijk van de overgebleven pijn. Indien de pijn steeds terugkeert is het misschien beter om een facetdenervatie te laten uitvoeren in de pijnkliniek.

Klachten?

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de uitvoering van het onderzoek, de communicatie met u, of andere zaken. In dat geval wordt u geadviseerd om zo mogelijk uw bezwaren direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s) of de dokter zelf.

Wij staan steeds open voor uw mening om zo onze werking te verbeteren.

Vragen

Contact opnemen

Telefoon: 09/228.03.33

E-mail: info@radiologie.gent

Web: www.radiologiesintamandsberg.be




RADIOLOGIE

**MEDISCHE
BEELDVORMING**

INFOBROCHURE:

FACET-INFILTRATIE



Facetgewrichten in de onderrug

Vanwaar de pijn?

Facetgewrichten zijn kleine gewrichtjes die de wervels in onze rug met elkaar verbinden en zo toelaten van te bukken, strekken en zijwaarts te plooiën. Pijn komt door ontsteking op deze gewrichtjes. Deze ontsteking kan ontstaan door verschillende redenen. Zo kan overbelasting de oorzaak zijn, een ongeval, slechte houding/statiek van de rug of ook slijtage van de facetgewrichten.

Hoe gaat alles te werk?

Vorbereiding

Indien u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moeten deze in overleg met uw behandelend arts tijdelijk gestopt worden. Voor andere medicijnen gelden geen beperkingen.

Bent u overgevoelig voor jodium, pleisters, of medicijnen? Meld dit aan de arts of verpleegkundige.


Behandeling

De behandeling wordt uitgevoerd op de RX-zaal. In de kleedkamer moet u eerst de regio ontbloten. Vervolgens komt u in de RX-zaal en gaat u op uw buik op de onderzoekstafel liggen.

Met de hulp van röntgenstralen wordt de juiste plaats voor de punctie bepaald. De radioloog desinfecteert uw huid en geeft hierin een verdovingsprik. De radioloog prikt met de naald verder tot hij in het facetgewricht zit. Vervolgens wordt opnieuw een deel van het verdovingsmiddel ingespoten gevolgd door een hoeveelheid cortisone. Indien u voor 2 facetgewrichten moet behandeld worden, herhaalt de radioloog alles opnieuw voor het 2^{de} gewricht. Voor u van de onderzoekstafel gaat controleert de radioloog of uw benen niet slapen door de verdoving.

Hoe lang duurt het?

In totaal duurt het onderzoek ongeveer 15 tot 20 minuten.



Met een fijne naald wordt tot in het gewricht geprikt

Risico's en bijwerkingen

Na deze ingreep heeft u de eerste 4-6 uur geen pijn. Daarna komt de pijn terug, omdat de verdoving is uitgewerkt. De eerste 2 tot 3 dagen na de behandeling mag u geen grote inspanningen doen. U mag de rug alleen bewegen binnen de pijngrenzen.

Complicaties

- Tijdelijke roodheid in het gelaat en/of lokaal (bijwerking cortisone). Dit kan gepaard gaan met hoofdpijn.
- Pijn die niet genoeg afneemt na de behandeling.
- Infectie van de huid na behandeling door het prikken.